

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ЦЕФАСИНУ
(CEFASINU)

Склад:

діючі речовини:

1 таблетка містить:

Chininum arsenicosum trit. D12	30 мг
Cinnabaris trit. D4	10 мг
Ferrum phosphoricum trit. D3	30 мг
Mercurius solubilis Hahnemanni trit. D5	130 мг

допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею білого кольору без специфічного запаху.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Не застосовується для гомеопатичних лікарських засобів.

Фармакокінетика.

Не застосовується для гомеопатичних лікарських засобів.

Клінічні характеристики

Показання.

Цефасину — гомеопатичний лікарський засіб, що застосовується для лікування захворювань дихальних шляхів, таких як гострі та хронічні запалення придаткових пазух носа.

Протипоказання

Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин.

Порушення функції нирок.

Дитячий вік до 12 років (через вміст ртуті).

Період вагітності або годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Взаємодія з іншими лікарськими засобами невідома.

Загалом, на дію будь-якого гомеопатичного лікарського засобу можуть негативно впливати загальні шкідливі фактори способу життя пацієнта та стимулятори (наприклад, кава, алкоголь, деякі продукти харчування тощо).

Особливості застосування

Таблетки Цефасину містять лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносності галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід приймати цей лікарський засіб.

При гострому запаленні придаткових пазух носа з гнійним нежитем або лихоманкою, а також якщо симптоми захворювання тривають більше тижня, потрібно звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або грудного годування лікарський засіб Цефасину застосовувати протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Немає необхідності в особливих заходах безпеки.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати перорально.

При гострих станах дозу має призначати лікар.

Максимальна рекомендована добова доза, зумовлена наявністю ртуті: 2 таблетки.

При хронічному захворюванні приймати по 1 таблетці 1–2 рази на добу.

Для підвищення ефективності треба дозволити таблетці розтанути в ротовій порожнині.

Якщо стан покращується, частоту прийому потрібно зменшити.

Лікарський засіб не слід застосовувати більше 1 тижня без консультації з лікарем.

Якщо прийом лікарського засобу було пропущено, не потрібно приймати подвійну дозу — слід продовжувати приймати таблетки відповідно до рекомендацій лікаря або як зазначено вище.

Діти.

Не застосовувати лікарський засіб дітям віком до 12 років (через вміст ртуті).

Передозування

Про випадки передозування не повідомлялося.

У разі прийому більшої, ніж рекомендовано, дози лікарського засобу Цефасину потрібно звернутися до лікаря.

Можливе посилення побічних реакцій.

Побічні реакції

Через наявність ртуті іноді можуть спостерігатися алергічні реакції.

Після застосування може з'явитися посилене слиновиділення — тоді прийом слід припинити.

Примітка: під час прийому гомеопатичних лікарських засобів може тимчасово спостерігатися погіршення наявних симптомів (початкове загострення). У таких випадках слід припинити прийом лікарського засобу і проконсультуватися з лікарем.

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Про випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу слід інформувати лікаря або повідомляти через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання

Спеціальних умов зберігання не потребує. Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.

Упаковка.

По 20 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник/заявник.

Цефак КГ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності / місцезнаходження заявника та представника заявника.

Остбанхофштрассе 15, 87437 Кемптен, Німеччина.

Контактні дані представника заявника в Україні — ТОВ "Мегаком":

вул. Клочківська, 195 Б, м. Харків, 61145; телефон: +38 (057) 701 37 55.

Дата останнього перегляду. 28.01.2025